

CONOCE NUESTRO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE CÁNCER DE CUELLO UTERINO EN EL ECUADOR.

NUESTRO PÚBLICO ENCUESTADO:

410 mujeres en Ecuador



7%

16 a 25 años

21%

de 26 a 35 años

30%


de 36 a 45 años

27%

de 46 a 55 años

15%

56 años en adelante



EN BASE A ESTE PÚBLICO SE PUDO EVIDENCIAR QUE:

97%


de las mujeres encuestadas tienen una vida sexual activa

3%


no tienen una vida sexual activa

LAS ENCUESTADAS RESPONDIERON LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

¿Es sexualmente activa?



¿Ha tenido varias parejas sexuales?




¿Cuántas parejas sexuales ha tenido?

- 48%** → De 1 a 3 parejas sexuales
- 26%** → De 4 a 7 parejas sexuales
- 23%** → De 8 parejas en adelante
- 3%** → Sin parejas sexuales


¿Cuándo fue su último Papanicolau realizado?

- 22%** → Nunca
- 24%** → Hace menos de un año
- 26%** → Hace 1 o 2 años
- 28%** → Hace más de 2 años





¿Ha tenido infecciones vaginales?

- 14%** → Nunca la he presentado
- 9%** → Cada mes
- 74%** → Cada 3 meses
- 2%** → Siempre




El 78% de las mujeres encuestadas respondieron que sí han realizado un estudio clínico para prevenir el cáncer de cuello uterino y el 22% nos indican que no lo han realizado.

¿Se ha realizado algún estudio para detectar cambios en el cuello del útero?



El 78% de las mujeres encuestadas respondieron que si han realizado un estudio clínico para prevenir el cáncer de cuello uterino y el 22% nos indican que no lo han realizado.

De las mujeres encuestadas, 319 mencionaron haber realizado un estudio clínico para detectar cambios en el cuello del útero, lo que representa que el 79% de las mismas prefieren realizar un test de Papanicolau ya que el precio es accesible, el 16% de mujeres encuestadas han realizado Colposcopia por pedido de su médico ginecólogo y únicamente el 5% de las mujeres encuestadas han realizado la prueba de biología molecular como método de prevención solicitado por el médico ya que no conocían de su existencia.



319 ♀ 

- 79% → Papanicolau
- 16% → Colposcopia
- 5% → Biología Molecular

De las mujeres encuestadas, el 54% se realizaron un estudio clínico para detectar cambios en el cuello del útero hace dos o tres años, el 20% hace uno o dos años y el 26% hace menos de un año.

¿Hace cuánto se realizó el último estudio?

319 ♀ 

- 26% → Hace menos de 1 año
- 20% → Hace 1 o 2 años
- 54% → Hace 2 o 3 años



De las población de mujeres encuestadas, obtuvimos que el 52% tiene VPH pero no recuerda si el virus es de alto o bajo riesgo, el 26% tiene resultado negativo y el 22% no ha realizado ningún estudio.

319 ♀ 

- 52% → Tiene VPH (Alto o bajo riesgo)
- 26% → Negativo
- 22% → Sin estudio realizado



De las 410 mujeres encuestadas, solo el 20% ha recibido las tres dosis de vacunación para prevenir infecciones provocadas por el VPH. El 80% de mujeres encuestadas no ha recibido ninguna dosis.



20% ↙
3 Dosis de vacunación

80% ↙
Sin vacunación



**ESTOS SON LOS DATOS, AHORA DEPENDE DE TI
DECIDIR DE QUÉ LADO DE LAS ESTADÍSTICAS QUIERES ESTAR.**

Recuerda que la prevención es la mejor forma de luchar contra el cáncer.